



Как выявить опухоль на ранних стадиях

Обнаружить предраковое заболевание, выявить опухоль на ранней стадии можно только в одном случае - если регулярно проходить профилактические обследования.

ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ

Рекомендуемые исследования	Возраст		
	18-39 лет	40-48 лет	49 лет и старше
Раннее выявление рака молочной железы			
Маммография	При наличии жалоб	1 раз в 3 года	1 раз в 2 года
Раннее выявление рака кишечника (колоректального рака)			
Исследование кала на скрытую кровь	При наличии жалоб		1 раз в 2 года
Пальцевое исследование прямой кишки	При наличии жалоб		1 раз в 2 года
Колоноскопия	При наличии жалоб	1 раз в 5 лет	
Раннее выявление рака предстательной железы			
Пальцевое исследование предстательной железы	При наличии жалоб		1 раз в 2 года
Исследование концентрации простатоспецифического антигена в крови (ПСА)	При наличии жалоб, в 45 лет, в 51 год (мужчины)		
Раннее выявление рака шейки матки			
Мазок на онкоцитологию	С 30 лет 1 раз в 3 года		
Раннее выявление рака легкого			
Флюорография (скрининг туберкулеза легкого)	1 раз в 3 года		

Приказ МЗ РФ от 26.10.2017 г. № 869 н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения»